骨折的種類

一般會分為三類

1. 簡單性骨折/閉合性骨折
   骨折處皮膚或黏膜完整，感染度低，骨沒有與體外部分接觸，一般固定治療後可漸漸癒合。

2. 粉碎性骨折/完全性骨折
   骨折處碎開成三塊或以上，皮膚或黏膜破裂，骨折端可能與外界相通。

3. 複雜性骨折/開放性骨折
   骨折處附近的皮膚和黏膜破裂，斷骨接觸到皮膚上或環境中的細菌，便需接受抗生素治療。

除此分類外，亦可按其位置、形態及程度等再細分為:
橫向骨折、線性骨折、壓迫性骨折、粉碎性骨折、剝離性骨折及脫臼骨折。

檢查

X光攝影，助了解骨折的類型及具體情況，對治療有很大的幫助。

治療方法:

- 閉合性骨折只需要於骨折處利用石膏或支架來固定，便可以自行癒合。
- 開放性骨折必須進行手術復位及固定。

常用的固定方法有:

外固定
使用石膏及外固定支架，從體外固定骨折部分。

內固定
使用鋼板、鋼針、螺絲釘或髓內針等，用手術方式於體內將骨折部分固定，

骨折的徵狀:

1. 疼痛
2. 內出血
3. 腫脹
4. 出現瘀斑
5. 周圍的神經及動靜脈有壓迫感
6. 可能出現發熱或休克徵狀
7. 肢體畸形
8. 有骨擦感或骨擦的聲音

東華東院骨科復康2015年編印